agrichim fenmedifam

Selectief herbicide o.a. in de bietenteelt.
Herbicide sélectif e.a. en culture de betteraves.

AgriChem nv/sa
Meerle

GEBRUIKSAANWIJZING: ZIE BIJSLUITER

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Het product bevat:

keton-derivaat	: 600 gram/liter	anion en niet-ionische detergenten	: 180 gram/liter
fenmedifam	: 160 gram/liter	andere	

Het kan een irritatie thv de ogen en huid veroorzaken.
Bij vermoeden van een vergiftiging onmiddellijk een arts waarschuwen en het **Antigifcentrum (070 245 245)** bellen.

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Na INADEMEN: het slachtoffer uit de besmette omgeving verwijderen.
Na INSLIKKEN: • als het slachtoffer slaperig is of niet bewust: NIET laten drinken. NIET laten braken, leg de patiënt op zijn zij en houd het hoofd wat lager. Maak de ademhalingswegen vrij door de kin en de tong naar beneden te trekken en het eventuele braaksel uit de mond te verwijderen. • wanneer het slachtoffer bewust is: Niet laten braken na inname van een slok. Na inname van een grotere hoeveelheid, vraag eerst advies of al dan niet laten braken noodzakelijk is. Het keton derivaat kan na aspiratie immers aanleiding geven tot een long-pneumonie.
Na morsen op KLEREN en HUID: De verontreinigde kledij verwijderen; haar en huid grondig wassen met water en zeep.
Na spatten in de OGEN: De oogleden goed opensperren en gedurende 10 minuten overvloedig spoelen met zacht stromend water. Spoel niet naar het andere oog toe. Als de irritatie meerdere uren blijft duren, een oogarts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Dit product irriteert de slijmvliezen, de ogen met tranen, cornea opaciteit. Het heeft een sterk zure pH. Uit dierenproeven zou men kunnen afleiden dat het inslikken van meer als een soeplepel van de onverdunde vloeistof door een kindje een zware vergiftiging kan uitlokken. Vergiftigingstekens verschijnen reeds bij een kleinere hoeveelheid.

1. KETONE derivaat (isoforon): wordt bij inademen, maar ook goed doorheen de huid en gastro-intestinaal opgenomen. Het wordt deels onveranderd langs de nier en de longen uitgescheiden. Het is erg irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen met o.a. hoesten en een pijnlijke keel. Bij spatten in de ogen werden cornea letsels vastgesteld. Dermatitis en paresthesien kunnen voorkomen. Het veroorzaakt een depressie van het CZS met hoofdpijn, duizeligheid, ataxie, Nausea en braken. Na ASPIRATIE (bv na braken) is een belangrijke chemische pneumonie mogelijk. Na inname van een grote hoeveelheid ook ademhalingsdepressie; metabole acidose; leverstoornissen; de vroeger beschreven nierstoornissen zijn mogelijk veroorzaakt door onzuiverheden.
2. FENMEDIFAM: huiduitslag werd bij de mens enkele malen beschreven. Het is weinig giftig bij proefdieren; bij grote hoeveelheid is een cholinesteraseremming mogelijk door onzuiverheden. Na metabolisatie wordt het snel renaal en met de faeces uitgescheiden.
3. DETERGENTEN en ANDERE: kunnen irritatie thv de slijmvliezen veroorzaken; o.a. gastrointestinaal. Een ander kan kruisallergie geven met aspirine of aanverwante medicamenten.

BEHANDELING

Meestal zal het gaan om een korte blootstelling of inname van een kleine hoeveelheid; geef wat water te drinken om het product te verdunnen. Niet laten braken; de onverdunde vloeistof heeft een sterk zure pH.
Bij hoge concentratie of na inname van een grote hoeveelheid:

1. Zuurstof; eventueel intuberen.
2. Maagaspiratie in Trendelenburg houding of onder endotracheale intubatie: het keton derivaat kan een aspiratie pneumonie veroorzaken. Na 8 u : RX longen om aspiratie-pneumonie uit te sluiten.
3. Medicinale houtskool oraal geven.
4. Het is niet geweten of een geforceerde diurese van enig nut is.

LABO: lever en nierfunctietesten

Na inname van een grote hoeveelheid: cholinesterase bepaling in het bloed; keton in urine.

Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

VORSTVRIJ EN OP EEN KOELE PLAATS BEWAREN.
GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK.

MODE D'EMPLOI: VOIR ANNEXE

INDICATIONS POUR LES PREMIERS SECOURS ET CONSEILS POUR LE MÉDECIN

Le produit contient :

Dérivés cétoniques:	600 grammes/litre	Anions et détergents non-ioniques	: 180 grammes/litre
Phenmédiphame:	160 grammes/litre	autres	

Peut provoquer une irritation aux yeux ou sur la peau.
En cas de suspicion d'empoisonnement, avertir immédiatement le médecin et appeler le **Centre Antipoisons (070 245 245)**.

CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS

En cas d'INHALATION: Évacuer la victime en dehors de la zone contaminée.
En cas d'INGESTION: •si la victime est somnolente ou inconsciente, NE PAS LA FAIRE BOIRE. NE PAS LA FAIRE VOMIR, laisser la victime sur son dos et lui maintenir la tête légèrement surélevée. Libérez les voies respiratoires en tirant le menton et la langue vers le bas et au besoin, dégager la gorge du vomi. • si la victime est consciente: ne pas laisser vomir après absorption d'une gorgée. Après absorption d'une plus grande quantité, demander d'abord l'avis d'un spécialiste pour vérifier si faire vomir la victime est utile. Les dérivés cétoniques peuvent après aspiration en effet provoquer une pneumonie.
Après éclaboussures sur les VÊTEMENTS ou la PEAU: Se débarrasser des vêtements contaminés, laver les cheveux et la peau abondamment avec de l'eau et du savon.
Après éclaboussures dans les YEUX: Maintenir les paupières grandes ouvertes et rincer abondamment pendant 10 minutes avec de l'eau coulant doucement. Ne pas faire couler vers l'œil non atteint. Si l'irritation persiste pendant plus de quelques heures, consulter un ophtalmologue.

CONSEILS POUR LE MÉDECIN

Ce produit irrite les muqueuses, les yeux en les faisant larmoyer, ainsi que l'opacité de la cornée. Il possède un pH fortement acide. Selon des expériences sur les animaux, nous pouvons en conclure que l'absorption de plus d'une cuillère à café de cette substance par un enfant peut provoquer une forte intoxication. Les signes d'empoisonnement disparaissent déjà lorsqu'une plus faible quantité est ingérée.

1. LES DERIVES CETONIQUES (ISOFORON): peuvent être absorbés par inhalation, mais aussi à travers la peau et le système gastro-intestinale.
   Ils sont rejetés par les poumons et partiellement transformés par les reins. Ils sont très irritants pour les yeux et le système respiratoire, avec pour conséquence, entre autres, la toux et une gorge douloureuse. En cas d'éclaboussures dans les yeux, des lésions dans la cornée sont parfois observées. La dermatite et la paresthésie peuvent survenir. Ces composés peuvent provoquer une dépression du système nerveux central, avec des maux de tête, étourdissements, nausées et vomissements. Après ASPIRATION (par ex. après avoir vomi), une importante pneumonie est possible. Après absorption d'une grande quantité, une dépression des systèmes respiratoires, une acidose ainsi que des disfonctionnements du foie peuvent être provoqués par les impuretés.
2. PHENMEDIPHAME: Des résultats suite à une exposition cutanée ont été décrits quelques fois chez l'homme. Le phenmédiphame est très peu toxique sur les animaux (tests labos). Dans beaucoup de cas une suppression de la cholinestérase est possible à cause des impuretés.
3. DÉTERGENTS ET AUTRES: Peuvent provoquer des irritations au niveau des muqueuses, entre autres, gastro-intestinales. Peut également provoquer des allergies si mélangé avec de l'aspirine et des médicaments apparentés.

TRAITEMENT

La plupart du temps il s'agira d'une courte exposition ou d'une absorption d'une petite quantité. Donner un peu d'eau à boire pour faire disparaître le produit. Ne pas faire vomir: le produit possède un pH fortement acide.
En cas de concentration importante ou après absorption d'une grande quantité:

1. Oxygène, éventuellement intuber.
2. Procéder à un lavage d'estomac ou sous intubation endotrachéale : les dérivés cétoniques peuvent provoquer une pneumonie. Après 8 heures: RX des poumons pour vérifier la présence d'une pneumonie.
3. Donner du charbon de bois médical par voie orale.
4. Il n'est pas précisé si une diurèse forcée soit de quelconque utilité.

LABO: Tester le bon fonctionnement de la fois et des reins.

Après absorption d'une grande quantité : déterminer le taux de cholinestérase dans le sang; et du cétone dans l'urine.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant du transport, du stockage et de l'utilisation de nos produits.

CONSERVER A L'ABRI DU GEL DANS UN LOCAL FRAIS.
BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI.

AGRICHIM FENMEDIFAM — **UN 3082**

ERKENNINGSNUMMER	**: 8140/B**
WERKZAME STOF	**: FENMEDIFAM**
GEHALTE	**: 160 G/L**
FORMULERINGSTYPE	**: EMULGEERBAAR CONCENTRAAT (EC)**
GIFTIGHEIDSKLASSE	**: B**
BEVAT ISOFORON	

SCHADELIJK/NOCIF IRRITEREND/IRRITANT

BIJZONDERE GEVAREN

Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. Irriterend voor de ademhalingswegen. Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Gevaar voor ernstig oogletsel. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

VOORZORGSMAATREGELEN

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

AGRICHIM FENMEDIFAM

NUMÉRO D'AGRÉATION	**: 8140/B**
MATIÈRE ACTIVE	**: PHENMÉDIPHAME**
TENEUR	**: 160 G/L**
TYPE DE FORMULATION	**: CONCENTRÉ ÉMULSIONNABLE (EC)**
CLASSE	**: B**
CONTIENT ISOFORON	

MILIEUGEVAARLIJK/ DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

RISQUES PARTICULIERS

Nocif par contact avec la peau et par ingestion. Irritant pour les voies respiratoires. Effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes. Risque de lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

MESURES DE PRÉCAUTION

Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas respirer les aérosols. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/ la fiche de données de sécurité.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

AGRICHEM nv/sa
Mons. Eestermansstraat 23
2328 Meerle (Hoogstraten)
Tel. 03 315 08 76
www.agrichem.com

NUMMER VAN DE PARTIJ: zie verpakking
NUMÉRO DU LOT: voir emballage

INHOUD/CONTENU: 5 LTR

8 717185 522945

19011

Specimen

AGRICHIM FENMEDIFAM

Selectief na-opkomst herbicide ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in de teelt van suiker- en voederbieten, rode bieten, spinazie, warmoes, aardbeien en sierplanten.

ANDERE VERMELDINGEN

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem). Bij verlaging van de dosis (bij de keuze van een systeem van gefractionneerde toepassingen) is het niet toegelaten de maximale dosering **(960 g fenmedifam als werkzame stof per ha en per 12 maanden)** te overschrijden, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten. Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

GEBRUIKSAANWIJZING

Agrichim Fenmedifam is een selectief na-opkomst onkruidbestrijdingsmiddel ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in de teelt van suiker- en voederbieten, rode bieten, spinazie, warmoes, aardbeien en sierplanten.

Toepassingen

Suiker- en voederbieten (kiemlobstadium - 8 bladstadium)

In totaal maximum 6 ltr/ha Agrichim Fenmedifam per 12 maanden, toe te passen in een onkruidbestrijdingsschema, waarbij het product onder de vorm van een gefractioneerde behandeling wordt toegediend. Met de onkruidbestrijding dient begonnen te worden op kiemend onkruid; in de regel is dit bij opkomst van de bieten. Tussen de behandelingen dient een wachttijd van ongeveer 7-10 dagen in acht te worden genomen. Geadviseerd wordt Agrichim Fenmedifam te verspuiten in 200-400 ltr water per ha. Agrichim Fenmedifam kan worden gemengd met voor deze toepassing erkende herbiciden. De toepassing dient na opkomst van de bieten plaats te vinden en kan op diverse manieren uitgevoerd worden:

1. Kort na opkomst van de onkruiden.
   Dosering: 0,5 ltr/ha Agrichim Fenmedifam + 350 gram a.s. /ha metamitron + 100 gram a.s. /ha ethofumesaat. Indien gewenst kan 0,5 ltr/ha (erkende) olie worden toegevoegd. De toepassing herhalen als nieuwe onkruiden aanwezig zijn. Als de onkruiden 1-2 echte blaadjes hebben of als minder gevoelige onkruiden voorkomen kunnen de doseringen met maximaal 100 % verhoogd worden.
2. In het twee-blad-stadium van de bieten.
   Dosering: 3 ltr/ha Agrichim Fenmedifam + 1050 gram a.s. /ha metamitron. De toepassing zo nodig herhalen in het vier-blad-stadium van de bieten.
3. In het twee-blad-stadium van de bieten.
   Dosering: 3 ltr/ha Agrichim Fenmedifam + 300 gram a.s. /ha ethofumesaat. De toepassing zo nodig herhalen in het vier-blad-stadium van de bieten. Deze combinatie wordt vooral geadviseerd tegen veelknopigen en kleefkruid.
4. Vanaf het twee-blad-stadium van de bieten.
   Dosering: 6 ltr/ha Agrichim Fenmedifam. De toepassing kan tevens gefractioneerd worden uitgevoerd.

Rode bieten (kroten)

Toepassen na opkomst als de kiemblaadjes van het gewas volledig zijn gestrekt.
Dosering: 4-6 ltr/ha Agrichim Fenmedifam, de hoogste dosering toepassen bij onkruiden met 1-2 echte blaadjes in 200-400 ltr/ha water.

Spinazie

Toepassen na opkomst van het gewas (2-4 bladeren). De toepassing kan enige gewasschade en opbrengstderving veroorzaken.
Dosering: 2 ltr/ha Agrichim Fenmedifam, eventueel in combinatie met 800 gram a.s./ha asulam. De toepassing kan tevens gefractioneerd worden uitgevoerd.

Warmoes

Toepassen na opkomst van het gewas (2-4 bladeren).
Dosering: 2 ltr/ha Agrichim Fenmedifam. De toepassing kan tevens gefractioneerd worden uitgevoerd.

Aardbeien

Toepassen:
- in het vermeerderingsveld: vanaf 14-21 dagen na het uitplanten, zodra de planten goed zijn aangeslagen;
- in het productieveld: vanaf 14-21 dagen na het uitplanten (zodra de planten goed zijn aangeslagen) tot het verschijnen van de eerste bloemknoppen.

Dosering: 4-6 ltr/ha Agrichim Fenmedifam.
De toepassing kan tevens gefractioneerd worden uitgevoerd. Niet toepassen in combinatie met andere middelen; minimaal 3 dagen in acht nemen tussen de toepassing van Agrichim Fenmedifam en andere middelen.

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) onder bescherming en open lucht

Toepassen tussen de rijen onder het gewas met een afschermkap
Dosering: 2-6 ltr/ha, eventueel gefractioneerd toepassen.
Opmerking: Het sortiment in de sierteelt is zeer groot en de gevoeligheid voor dit middel kan zelfs binnen een soort nog variabel zijn. Raadpleeg voor meer informatie uw leverancier.

specimen

Restricties

Spuit op een afgehard, droog en gezond gewas. Spuit niet op een gewas dat verzwakt is door insecten, stuifschade, nachtvorst of herbiciden. Spuit niet bij scherp, zonnig weer; in dit geval bij voorkeur 's avonds spuiten.

Mengvoorschriften

Spuit met grondig schoongemaakte apparatuur. Giet 20-50 liter water in de tank. Vermijd gebruik van kalk- of ijzerhoudend water. Voeg Agrichim Fenmedifam toe en zet het roersysteem in werking. Vul verder aan met water. Laat de roerinrichting in werking, zowel bij het vullen van de tank als tijdens het spuiten. Spuit direct na gereedmaken van de spuitvloeistof en houd deze voortdurend in beweging.

VERNIETIGING VAN VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

De ledige verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden door middel van een manueel systeem (drie opeenvolgende malen schudden met water) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de verbruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien verzamelpunt. Spuitoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten, noch met het middel, noch met de verpakking besmetten. De verpakking in geen geval herbruiken voor een ander doel.

191011

AGRICHIM FENMEDIFAM

Un herbicide sélectif employé en post émergence dans les cultures de betteraves sucrières, fourragères, rouges, les épinards, les bettes, les fraises et les plantes ornementales; pour lutter contre les dicotylées annuelles.

AUTRES MENTIONS

La dose agréée est la dose la plus faible qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des cas. Cette dose peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans des programmes de désherbage par mini-doses (programme FAR). Lors de la réduction de dose (en vertu du système d'application fractionnée), il n'est pas autorisé de dépasser la dose maximum **(960 g de phenmédiphame en tant que substance active par ha et par 12 mois)** ni de réduire le délai avant récolte. Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

MODE D'EMPLOI

Agrichim Fenmedifam est un herbicide sélectif employé en post émergence dans les cultures de betteraves sucrières, fourragères, rouges, les épinards, les bettes, les fraises et les plantes ornementales pour lutter contre les dicotylées annuelles.

Applications

Betteraves sucrières et fourragères (stade cotylédons - stade 8 feuilles)

Maximum 6 litres/ha d' Agrichim Fenmedifam au total par 12 mois, à appliquer dans un schéma de désherbage dans lequel le produit est appliqué sous forme de traitement fractionné. Le désherbage doit être entamé en début de germination des mauvaises herbes; en règle générale, cela correspond à la levée des betteraves. Un délai d'environ 7 à 10 jours doit être pris en compte entre chaque traitement. Il est conseillé de pulvériser Agrichim Fenmedifam dans 200 à 400 litres d'eau par ha. Agrichim Fenmedifam peut être mélangé avec des herbicides agréés pour cette application. L'application doit être réalisée après la levée des betteraves et peut être exécutée de différentes manières:

1. Peu après la levée des mauvaises herbes.
   Dosage: 0,5 litre/ha d' Agrichim Fenmedifam + 350 grammes m.a. /ha métamitrone + 100 grammes m.a. /ha éthofumésate. Si on le souhaite, on peut ajouter 0,5 litre/ha d'huile (agréée). Répéter l'application en présence de nouvelles mauvaises herbes. Si les mauvaises herbes ont 1 ou 2 vraies feuilles ou si des mauvaises herbes moins sensibles apparaissent, le dosage maximal autorisé peut être appliquée.
2. Au stade 2 feuilles des betteraves.
   Dosage: 3 litres/ha d' Agrichim Fenmedifam + 1050 grammes m.a. /ha métamitrone. Répéter l'application si nécessaire au stade 4 feuilles des betteraves.
3. Au stade 2 feuilles des betteraves.
   Dosage: 3 litres/ha d' Agrichim Fenmedifam + 300 grammes m.a. /ha éthofumésate. Répéter l'application si nécessaire au stade 4 feuilles des betteraves. Cette combinaison est surtout conseillée contre les polygonacées et le gaillet.
4. A partir du stade 2 feuilles des betteraves.
   Dosage: 6 litres/ha d' Agrichim Fenmedifam. L'application peut également s'effectuer de manière fractionnée.

Betteraves rouges (potagères)

Appliquer après la levée, lorsque les cotylédons de la culture sont entièrement déployés.
Dosage: 4-6 litres/ha d' Agrichim Fenmedifam, appliquer la dose maximale en cas de présence de mauvaises herbes avec 1 ou 2 vraies feuilles, dans 200 à 400 litres/ha d'eau.

Epinards

Appliquer après la levée de la culture (2-4 feuilles). L'application peut provoquer quelques dommages à la culture et une perte de rendement.
Dosage: 2 litres/ha d' Agrichim Fenmedifam, en combinaison possible avec 800 grammes m.a./ha asulame. L'application peut également s'effectuer de manière fractionnée.

Bettes

Appliquer après la levée de la culture (2-4 feuilles).
Dosage: 2 litres/ha d' Agrichim Fenmedifam. L'application peut également s'effectuer de manière fractionnée.

Fraises

Appliquer:
- dans le champ de multiplication: à partir de 14 à 21 jours après le repiquage, dès que les plants se sont bien développés;
- dans le champ de production: à partir de 14 à 21 jours après le repiquage (dès que les plants se sont bien développés), jusqu'à l'apparition des premiers boutons.

Dosage: 4-6 litres/ha d' Agrichim Fenmedifam.
L'application peut également s'effectuer de manière fractionnée. Ne pas appliquer en combinaison avec d'autres produits; attendre au moins 3 jours entre l'application d' Agrichim Fenmedifam et celle d'autres produits.

Plantes ornementales (non destinées à la consommation)
Sous protection et plein air

Traitement des interlignes de la culture sans toucher la culture en place avec une cloche de protection.
Dosage: 2-6 litres éventuellement fractionné.
Remarque : La gamme des plantes ornementales est très grande et la sensibilité pour ce produit peut être variable, même au sein d'une espèce. Consultez votre fournisseur pour plus d'information.

Restrictions

Appliquer sur une culture bien implantée, sèche et saine. Ne pas appliquer sur une culture affaiblie par des insectes, poussières, gelées nocturnes ou herbicides. Ne pas appliquer en cas de fort ensoleillement; dans ce cas, appliquer de préférence le soir.

Prescriptions d'application

Veiller à nettoyer correctement l'appareil de pulvérisation avant son utilisation. Remplir le conteneur avec 20-50 litres d'eau. Éviter l'utilisation d'eau calcareuse ou ferrugineuse. Ajouter Agrichim Fenmedifam et mettre le mélangeur en route. Ajouter de l'eau par la suite. Laisser le mélangeur en fonction, tant pendant le remplissage que pendant l'application. Appliquer directement après que le mélange soit effectué, en veillant à préserver l'homogénéité de ce mélange tout au long de l'application.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage vide de ce produit doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet. Diluer le surplus de traitement au moins 10 fois et les appliquer sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fosses avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins.

specimen